Quantification a posteriori de la diffusion numérique

Vina Aguilon,
LSU SU

Emmanuel Audoubert,
LAGA Paris 13

Vivien Devreux
LANFA U Picardie

suite à des discussions avec

Julie Deshayes
Guwan Badec
Sibylle Téchène

LOCEAN, SU

- Brève présentation de NZMO et de la motivation de ce travail
- Obtention de "cartes de diffusion numérique" par une procédure de minimisation a posteriori
- Notre schéma est-il entropique ?
- Perspectives

Nucleus for European Modelling of the Ocean

Pour les applications climatiques:
certaines de simulations planétaires
sur des siècles

$\Delta x \approx 100 \text{ km}$ (au mieux 10 km)

Code complexe:

- paramétrisations sous maille
- nombreux splitting
- ordre élevé

Importance de la diffusion numérique

« A persistent characteristics of oceanic water masses at all scales is that they are advected over long distances without much transformation »

(Burchard Rennau 12)

« turbulent mixing has been observed to be very weak in much of the ocean »

(Ilicak 12)

- L'océan stocke très bien la chaleur
- La circulation océanique la répartit de l'équateur vers les pôles

• Réaction au changement climatique ?

a un signe perturbé le bilan

$$\partial_t E_{td} + \partial_x F^E = D_{\text{phys}} - D_{\text{num}}(\Delta x)$$

petite, mais cruciale en temps long

Cadre mathématique: EDP hyperbolique et schéma volumes finis

système hyperbolique

$$\partial_t U + \partial_x f(U) = 0$$

$$U \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

schéma de volumes finis

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + \frac{f_{j+\frac{1}{2}}^n - f_{j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta x} = 0$$

$$f_{j+\frac{1}{2}}^n = \mathcal{F}^n(U_{j-\frac{1}{2}+i}, \dots, U_j, U_{j+1}, \dots, U_{j+\frac{1}{2}+i})$$

$$U_j^n \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(t^n, x) dx$$

$$f_{j+\frac{1}{2}}^n \approx \frac{1}{\Delta t} \int_{t^n}^{t^{n+1}} f(U(s, x_{j+\frac{1}{2}})) ds$$

consistance

$$\mathcal{F}^n(U, U, \dots, U) = f(U)$$

" le schéma est exact (localement) sur les constantes

Cadre mathématique. inégalités d'entropie discrète

Inégalité d'entropie continue

$$\partial_t U + \partial_x f(U) = 0 \quad \oplus \quad \partial_t \eta(U) + \partial_x \theta(U) \leq 0$$

avec $\eta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $\theta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $D_\eta Df = D\theta$

égalité si U est $\mathcal{E}^1$. Critère de sélection des chocs.

Inégalité d'entropie discrète

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + \frac{f_{j+\frac{1}{2}}^n - f_{j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta x} = 0 \quad \oplus$$

$$\frac{\eta(U_j^{n+1}) - \eta(U_j^n)}{\Delta t} + \frac{\theta_{j+\frac{1}{2}}^n - \theta_{j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta x} = D_j^n \leq 0$$

C'est IMPORTANT

convergence vers une solution physique
stabilité

et DIFFICILE

ordre 1 essentiellement
pire avec un terme source

Trouver $G_{j+\frac{1}{2}}$ et D_j^m via une minimisation

déterminés par le schéma numérique

$$\frac{\eta(U_j^{m+1}) - \eta(U_j^m)}{\Delta t} + \frac{G_{j+\frac{1}{2}} - G_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta x} = D_j^m$$

ce qu'on cherche
(le choix des $G_{j+\frac{1}{2}}$
impose D_j^m)

On aimerait de plus $D_j^m \leq 0$

• Des flux numériques d'entropie consistants

$$G_{j+\frac{1}{2}} = \mathcal{G}(U_{j-s_2+1}, \dots, U_j, U_{j+1}, \dots, U_{j+s_2}) \text{ avec } \mathcal{G}(U, U, \dots, U) = G(U)$$

$$(G_{j+\frac{1}{2}})_j = \text{argmin}_{(G_{j+\frac{1}{2}})_j} \underbrace{\int^D(\tau)}_{\text{diffusion}} + \underbrace{\int^C(\tau)}_{\text{consistance}}$$

Choix de la fonctionnelle, partie diffusive

$$\frac{\eta(u_j^{n+1}) - \eta(u_j^n)}{\Delta t} + \frac{\sigma_{j+\frac{1}{2}} - \sigma_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta x} = D_j^n$$

avec

D_j^n négatif
 $\sigma_{j+\frac{1}{2}}$ constant

$$J^D(\sigma) = \sum_j \max \left(0, \frac{\eta(u_j^{n+1}) - \eta(u_j^n)}{\Delta t} + \frac{\sigma_{j+\frac{1}{2}} - \sigma_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta x} \right)^2$$

$$J^D(\sigma) = 0 \Leftrightarrow$$

le choix $\sigma_{j+\frac{1}{2}} = \sigma_{j-\frac{1}{2}}$ donne des diffusions numériques négatives

Choix de la fonctionnelle, partie consistante

$$\frac{\eta(U_j^{n+1}) - \eta(U_j^n)}{\Delta t} + \frac{\sigma_{j+\frac{1}{2}} - \sigma_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta x} = D_j^n \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} D_j^n \text{ négatif} \\ \sigma_{j+\frac{1}{2}} \text{ consistant} \end{array}$$

rappel consistance: $G_{j+\frac{1}{2}} = \Psi(U_{j-S_L+1}, \dots, U_{j+S_R}) \xrightarrow{(U_{j-S_L+1}, \dots, U_{j+S_R}) \rightarrow (U_1, \dots, U)} G(U)$

$$J^c(\sigma) = \sum_j \max(0, \sigma_{j+\frac{1}{2}} - M_{j+\frac{1}{2}}^c)^2 + \max(0, m_{j+\frac{1}{2}}^c - \sigma_{j+\frac{1}{2}})^2$$

- $J^c(\sigma) = 0 \Leftrightarrow m_{j+\frac{1}{2}}^c \leq \sigma_{j+\frac{1}{2}} \leq M_{j+\frac{1}{2}}^c$
- On demande $m_{j+\frac{1}{2}}^c(U, \dots, U) = M_{j+\frac{1}{2}}^c(U, \dots, U) = G(U)$

Chap des bornes a priori de consistance $M_{j+\frac{1}{2}}^c$ et $m_{j+\frac{1}{2}}^c$

L'idée : bilan d'énergie sur une donnée initiale modifiée ($s_L = s_R = 2$)

$$\tilde{U}_{j+k} = \begin{cases} U_{j+k} & \text{si } j-s_L+1 \leq k \leq j+s_R \\ U_{j-s_L+1} & \text{si } k \leq j-s_L+1 \\ U_{j+s_R} & \text{si } k \geq j+s_R \end{cases}$$

Chap des bornes a priori de consistence $M_{j+\frac{1}{2}}^c$ et $m_{j+\frac{1}{2}}^c$

L'idée : bilan d'énergie sur une donnée initiale modifiée ($s_L = s_R = 2$)

$$\tilde{U}_{j+k} = \begin{cases} U_{j+k} & \text{si } j-s_L+1 \leq k \leq j+s_R \\ U_{j-s_L+1} & \text{si } k \leq j-s_L+1 \\ U_{j+s_R} & \text{si } k \geq j+s_R \end{cases}$$

① $F_{j+\frac{1}{2}}$, $G_{j+\frac{1}{2}}$ sont indépendants de U_{j-2} , U_{j+3}

Chap des bornes a priori de consistence $M_{j+\frac{1}{2}}^c$ et $m_{j+\frac{1}{2}}^c$

d'idée : bilan d'énergie sur une donnée initiale modifiée ($s_L = s_R = 2$)

① $F_{j+\frac{1}{2}} = \tilde{F}_{j+\frac{1}{2}}$ $G_{j+\frac{1}{2}} = \tilde{G}_{j+\frac{1}{2}}$

$$\tilde{U}_{j+k} = \begin{cases} M_{j+k} & \text{si } j-s_L+1 \leq k \leq j+s_R \\ U_{j-s_L+1} & \text{si } k \leq j-s_L+1 \\ U_{j+s_R} & \text{si } k \geq j+s_R \end{cases}$$

① $F_{j+\frac{1}{2}}, G_{j+\frac{1}{2}}$ sont indépendants de U_{j-2}, U_{j+3}

② Flux sur la donnée modifiée connus au bord

Chap des bornes a priori de consistance $M_{j+\frac{1}{2}}^c$ et $m_{j+\frac{1}{2}}^c$

d'idée : bilan d'énergie sur une donnée initiale modifiée ($s_1 = s_2 = 2$)

Bilan d'énergie de part et d'autre de $j+\frac{1}{2}$, hyp: schéma entropique

$$\sum_{k=2s_2-2}^0 \eta(\tilde{U}_{jk}^{n+1}) \leq \sum_{k=2s_2-2}^0 \eta(\tilde{U}_{jk}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta x} (G_{j+\frac{1}{2}} - G(U_{j-\frac{1}{2}+1}^n))$$

$$m_{j+\frac{1}{2}}^c \leq G_{j+\frac{1}{2}} \leq M_{j+\frac{1}{2}}^c$$

$$\sum_{k=1}^{2s_2+1} \eta(\tilde{U}_{j+k}^{n+1}) \leq \sum_{k=1}^{2s_2+1} \eta(\tilde{U}_{j+k}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta x} (G(U_{j+s_2}^n) - G_{j+\frac{1}{2}})$$

Résultats théoriques

prop 1: Si le schéma est entropique
alors $\eta((\bar{b}_{j+\frac{1}{2}})_j) = 0$ $\left(\eta(U_j^{n+1}) \leq \eta(U_j^n) - \frac{\Delta t}{\Delta x} (b_{j+\frac{1}{2}} - b_{j-\frac{1}{2}}) \right)$

prop 2: Si $\eta((\bar{b}_{j+\frac{1}{2}}^{\text{opt}})_j) = 0$, alors
et $(\bar{b}_{j+\frac{1}{2}}^{\text{opt}})$ est constant. $\eta(U_j^{n+1}) \leq \eta(U_j^n) - \frac{\Delta t}{\Delta x} (b_{j+\frac{1}{2}}^{\text{opt}} - b_{j-\frac{1}{2}}^{\text{opt}})$

prop 3: Si $\eta((\bar{b}_{j+\frac{1}{2}})_j) = \eta((\bar{b}_{j+\frac{1}{2}})_j) = 0$, alors
 $|b_{j+\frac{1}{2}} - \bar{b}_{j+\frac{1}{2}}| = \sum_{k=-s_2+1}^{s_2} O(|U_{j+k}^n - U_j^n|^2) = O(\Delta x^2)$

prop 4: L'encadrement $m_{j+\frac{1}{2}}^c \leq \bar{b}_{j+\frac{1}{2}} \leq M_{j+\frac{1}{2}}^c$ suffit
pour obtenir le théorème de Lax-Wendroff.

Résultats numériques: équation de Burgers, schémas d'ordre 1

Rusanov+ Euler

Godunov+ Euler

Roe+ Euler

Dynamique des gazs, ordre 2, influence du schéma

L'approche MUSCL pour l'ordre 2 en espace

début de l'itération

reconstruction affine

Deux objectifs :
 • atteindre l'ordre 2 sur les données régulières
 • TVD, principe du max $\rightarrow$ théorie des limiteurs

$$\sigma_j^m = \phi \left(\frac{u_{j+1}^m - u_j^m}{u_j^m - u_{j-1}^m} \right)$$

flux MUSCL - Van Leer

$$F_{j+1/2} = \mathbb{R} (u_{j+1/2}^m, u_{j+1/2}^m)$$

flux d'ordre 1
entropique

In système : Quelles variables reconstruire ?
 Quel limiteur ?

Discretisation RK2 en temps. Influence sur l'entropie

La discretisation espace diminue le bilan d'entropie en $O(\Delta x^p)$

La discretisation en temps augmente le bilan d'entropie en $\propto O(\Delta t^q)$

$$p=q=1 : \partial_t \eta(u) + \partial_x \theta(u) = O(\alpha \Delta t - \Delta x) \leq 0 \text{ sous CFL}$$

$$p=2, q=1 : = O(\alpha \Delta t - \Delta x^2) \geq 0 \text{ sous CFL hyperbolique } \Delta t \approx \Delta x$$

$p=q=2$: De l'espoir mais pas de preuve

$$\eta(U_j^{n+1}) \leq \frac{\eta(U_{j-\frac{1}{2}}^n) + \eta(U_{j+\frac{1}{2}}^n)}{2} - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\theta_{j+\frac{1}{2}} - \theta_{j-\frac{1}{2}})$$

Dynamique des gazs, schéma d'ordre 2, influence des limiteurs

Temps de calcul et quantification a priori

$$D_j^n = \eta(U_j^{n+1}) - \eta(U_j^n) + \frac{\Delta t}{\Delta x} (f_{j+\frac{1}{2}}^{\text{opt}} - f_{j-\frac{1}{2}}^{\text{opt}})$$

cher

$$f_{j\pm\frac{1}{2}}^{\text{opt}} \in [m_{j\pm\frac{1}{2}}^c, M_{j\pm\frac{1}{2}}^c]$$

abordable

$$\frac{D_j^n}{\Delta x} \leq \frac{D_j^n}{\Delta x} \leq \frac{D_j^n}{\Delta x}$$

$$D_j^n = \eta(U_j^{n+1}) - \eta(U_j^n) + \frac{\Delta t}{\Delta x} (m_{j+\frac{1}{2}}^c - M_{j-\frac{1}{2}}^c)$$

⊕ renormalisation naïve

$$\propto \sum_j D_j^n = \sum_j D_j^n = \sum_j \eta(U_j^{n+1}) - \eta(U_j^n)$$

Comparison a priori / a posteriori

La minimisation qui vérifie si un schéma est entropique

def: Un schéma est entropique si pour tout $(U_j^n)_j$, on peut trouver des flux numériques d'entropie tels que

$$\eta(U_j^{n+1}) \leq \eta(U_j^n) - \frac{\Delta t}{\Delta x} (b_{j+\frac{1}{2}} - b_{j-\frac{1}{2}}) \quad \text{et} \quad b_{j\pm\frac{1}{2}} \in [m_{j\pm\frac{1}{2}}^c, M_{j\pm\frac{1}{2}}^c]$$

corollaire: Un schéma n'est pas entropique si il existe une donnée initiale $(U_{-s_L}^0, \dots, U_0^0, \dots, U_{s_R}^0)$ (taille $s_L + s_R + 1$) t_0

OU

$$A. \quad \eta(U_0^1) - \eta(U_0^0) + \frac{\Delta t}{\Delta x} (m_{\frac{1}{2}}^c - M_{-\frac{1}{2}}^c) > 0$$

OU

$$B. \quad m_{\frac{1}{2}}^c - M_{\frac{1}{2}}^c > 0$$

$$C. \quad m_{-\frac{1}{2}}^c - M_{-\frac{1}{2}}^c > 0$$

$$\min_{(U_{-s_L}^0, \dots, U_{s_R}^0) \in \Omega_{s_L + s_R + 1}} (A, B, C) < 0$$

$\Leftrightarrow$ schéma non entropique

MUSCL minmod + RK2 non entropique

Perspective: tests de différents "entropy fix" par le schéma de Roe.

Conclusion

- Construction d'une fonctionnelle pour quantifier la diffusion numérique.
- Obtention de bornes a priori pour les flux d'entropie numériques
- Les diffusions numériques "a posteriori" convergent pour les schémas d'ordre < 2
- Proposition d'une quantification "a priori" qui donne de bons résultats
- Deuxième minimisation pour construire la pire donnée initiale en terme d'entropie
- MUSCL + RK2 minmod non entropique

Pour aller vers l'océano ...

Modèle Saint Venant 2D

Complications essentiellement techniques sur maillage cartésien?

$$\begin{cases} \partial_t h + \partial_x (hu) + \partial_y (hv) = 0 \\ \partial_t (hu) + \partial_x \left(hu^2 + \frac{g}{2} \frac{\rho}{\rho_0} h^2 \right) + \partial_y (huv) = -gh \partial_x \beta b - \nu \partial_x (h \partial_x u) - ghv \\ \partial_t (hv) + \partial_x (huv) + \partial_y \left(hv^2 + \frac{g}{2} \frac{\rho}{\rho_0} h^2 \right) = -gh \partial_y \beta b - \nu \partial_x (h \partial_x v) + gh u \\ \partial_t (h\epsilon) + \partial_x (hu\epsilon) + \partial_y (hv\epsilon) = 0 \end{cases}$$

↳ Bilan sur $h\epsilon^2$ important en océano

⊕ splitting barotrope / barocline

↳ termes sources: influence sur le bilan d'entropie.
Impact sur $m_{j+\frac{1}{2}}^c$ et $\Pi_{j-\frac{1}{2}}^c$?

Merci !